

Nouveaux Clérides exotiques (Col.)

par

MAURICE PIC

Enopliomorpha bicoloripes n.sp.

Elongata et angustata, subparallela, nitida, paulo griseo pubescens et fusco hirsuta, testacea, elytris nigris vage violaceis, oculis, palpis apice, articulis tribus ultimis antennarum, tibiisque pro parte diverse nigris. Capite sat minute et sparse punctato, oculis prominulis et distantibus; antennis gracilibus, articulo 1° pro parte brunneo et crasso, 2° parum lato, sequentibus angustatis et diversis, 6—8 brevibus, paulo latioribus, 8—9 sat valde dilatatis, ad basin attenuatis, sat grandis, ultimo longiore, parum lato, apice subacuminato; thorace parum elongato, lateraliter fere recto, minute et sparse punctato; scutello testaceo. Elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subparallelis, parum distincte et diverse punctatis; pedibus anticis latioribus, tibiis paulo curvatis. Long 5 mill.

O. africa : Nandi. Communiqué par J. B. Corporaal.

Diffère de *E. Burgeoni* Pic, du Congo, que je n'ai plus sous les yeux, par les élytres pas très larges, la coloration non bleue de ces organes, les pattes plus largement claires.

Enopliomorpha somalica n.sp.

Elongata, subparallela, nitida, hirsuta, rufo-testacea, elytris cyaneis, membris nigris, articulo 1° antennarum et femoribus ad basin late rufis. Capite breve et lato, thorace latiore, sat minute non dense punctato, oculis maximis, mediocre separatis. Antennis 11-articulatis, articulis tribus ultimis dilatatis, articulo 9°—10° fere aequalibus, his apice arcuate incisus et infra angulate prolongatis, ultimo longissimo, sat lato, depresso. Thorace elongato, elytris angustiore, lateraliter subarcuato, postice angustiore, supra vage impresso, sat fortiter, irregulariter et sparse punctato. Elytris sat elongatis, subparallelis, sat fortiter non dense punctatis. Pedibus sat validis, pilosis. Long. 8 mill.

Somalie Italienne : Belet-Uem (ex Lomi). Communiqué par J. B. Corporaal. Type au Musée d'Amsterdam.

Je n'ai plus sous les yeux le type de *E. Burgeoni* Pic, du Congo, mais la présente espèce, en outre du 1er article des antennes roux, me semble en différer par la structure des deux avant-derniers articles des antennes et leur forme plus élargie, les pattes assez robustes.

Enopliomorpha cyanipennis mihi

Elongata, postice paulo latior et apice breve attenuata, supra sparse griseo pubescens et fusco hirsuta, infra luteo pubescens, nitida, rufa, antennis apice, tibiis tarsisque nigris. Long. 9 mill.

Africa centralis : Bangui (ex Musée de Dahlem).

Diffère de *E. Burgeoni* Pic par le 1er article de la massue des antennes à peu près de la longueur du 2me, celui-ci nettement plus court chez *E. Burgeoni* Pic et en outre triangulairement élargi en avant, tandis qu'il est plutôt parallèle chez l'espèce du Congo.

Enopliomorpha parallela mihi

Elongata, subparallela, nitida, sparse griseo pubescens et fusco hirsuta, rufo-testacea, elytris nigro metallicis, membris nigris. Capite mediocre punctato, oculis griseis, prominulis. Antennis sat brevibus, articulis 3—5 paulo elongatis, 6—8 brevibus, tribus ultimis valde depresso, 9—10 apice intus dentatis, ultimo longissimo, parum lato, apice truncato.

Thorace elongato, antice et postice paulo attenuato, postice marginato, sparse punctato. Scutello testaceo. Elytris thorace paulo latioribus, elongatis, subparallelis, sat minute et sparse punctatis. Long. 7 mill.

Africa australis : Rhodesia (ex Musée de Dahlem).

Diffère du précédent par la forme subparallèle des élytres et leur coloration non bleutée, la forme particulière du dernier article des antennes, les pattes entièrement foncées.

Opilo Carreti n.sp.

Angustatus, nitidus, parum hirsutus, rufo-brunneus, elytris pallidioribus, pedibus rufis. Capite cum oculos, his valde convexis, thorace latiore. Thorace elongato, lateraliter sinuato, postice angustiore, vage plicato, minute et sparse punctato. Elytris parum elongatis, parallelis, antice striatis, sat fortiter lineato-punctatis, postice minute non regulariter punctatis. Pedibus sat brevibus. Long. 10 mill.

Madagascar : Befavona (ex Carret, in coll. Pic).

Espèce très caractérisée par sa forme étroite, jointe à la sculpture élytrale et l'absence de tout dessin clair ou foncé. Peut se placer près de *O. sanguinipes* Fairm.

Axina longevittata n.sp.

Elongata, nitida, longe griseo pubescens et hirsuta, nigro-picea, thorace antice et infra corpore pro majore parte rufis, elytris apice luteis, nigro-piceis, ad suturam anguste et in disco reducte sub-luteo lineatis, membris rufis, femoribus apice late et tibiis ad basin paulo piceis. Capite cum oculos thorace paulo latiore. Thorace elongato, lateraliter sinuato, medio supra paulo impresso, minute punctato. Elytris thorace latioribus, parum elongatis, subparallelis, apice reducte attenuatis, his ad basin post medium pro parte regulariter parum fortiter punctatis, postice minute et irregulariter punctatis. Long. 9 mill.

Brésil : Goyaz (coll. Pic.).

Espèce caractérisée par la coloration particulière des élytres présentant, sauf au sommet, des bandes alternées longitudinales claires ou foncées.